

Acthar[®] GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

Patient Support

Su Diario de tratamiento de Acthar Gel

Abby,
que usa Acthar Gel.
Los resultados individuales
pueden variar.

Una herramienta para ayudarle a registrar sus inyecciones y seguir por buen camino con su plan de tratamiento

Consulte la Información Importante sobre la seguridad en las páginas 18-20, y la [Información de prescripción completa](#).

¿Qué es Acthar Gel?

Acthar® Gel es un medicamento de venta con receta que se utiliza para:

- La reducción de la proteinuria en las personas con síndrome nefrótico del tipo idiopático (de origen desconocido) sin uremia (acumulación de urea en la sangre debido a un fallo de los riñones) o el debido a lupus eritematoso (lupus).
- El tratamiento de los espasmos infantiles en lactantes y niños menores de 2 años.
- El tratamiento de adultos con recaídas agudas o brotes de esclerosis múltiple (EM). Se ha demostrado mediante estudios que Acthar es eficaz para acelerar la recuperación en las recaídas de la esclerosis múltiple. No obstante, no hay evidencia de que influya en el desenlace de la enfermedad ni en su evolución natural.
- El tratamiento de enfermedades alérgicas e inflamatorias graves, agudas y crónicas, que afectan a distintas estructuras del ojo, como la córnea y el iris, en la parte delantera del ojo, o el nervio óptico y la retina, en la parte trasera.
- El tratamiento de personas con síntomas de sarcoidosis.
- El tratamiento de los brotes o como tratamiento continuado (de mantenimiento) en las personas con lupus eritematoso sistémico (lupus).
- El tratamiento de los brotes o como tratamiento continuado (de mantenimiento) en las personas con dermatomiositis o polimiositis (DM-PM).
- El tratamiento complementario a corto plazo (a fin de aliviar al paciente en un episodio agudo o exacerbación) en: artritis psoriásica; artritis reumatoide, que incluye la artritis reumatoide juvenil (ciertos casos pueden precisar una terapia de mantenimiento con dosis bajas); espondilitis anquilosante.

Acthar se inyecta debajo de la piel o en el músculo.

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA

NO USE Acthar hasta haber hablado con su médico si se da alguna de las siguientes circunstancias:

- Ha recibido o está a punto de recibir una vacuna de virus vivos o de virus vivos atenuados.
- Padece una enfermedad de la piel llamada esclerodermia.
- Tiene pérdida de la densidad ósea u osteoporosis.
- Presenta cualquier infección, ya sea por hongos, bacteriana o viral.
- Tiene infecciones en los ojos, como el herpes simple ocular.

Mallinckrodt pretende que este documento sea informativo, pero debe recordar que los contenidos son de naturaleza general y no pretenden sustituir el asesoramiento específico de los profesionales, que puede ser necesario en función de sus preguntas y necesidades individuales. Hemos hecho todo lo razonablemente posible para proporcionar información útil y precisa; sin embargo, no lo garantizamos y usted no debe confiar únicamente en la información incluida en este documento. Este diario no debe utilizarse para pacientes con espasmos infantiles. Para los cuidadores de pacientes con EI, consulte Acthar.com.

Consulte la Información Importante sobre la seguridad en las páginas 18-20, y la [Información de prescripción](#) completa.


Mantenerse en el buen camino empieza aquí

Este diario puede ayudarle a seguir motivado a medida que avance en su plan de tratamiento. Llévelo a todas las citas con su médico para que usted y su médico puedan revisar su progreso y comentar cualquier objetivo del tratamiento o pregunta que tenga.

Adentro encontrará herramientas que le ayudarán a:

- ✓ Registrar su pauta posológica del tratamiento
- ✓ Monitorear su progreso
- ✓ Hacer un seguimiento de las inyecciones y de cómo se siente
- ✓ Escribir los objetivos del tratamiento y las preguntas para su médico

Gary
que toma Acthar Gel.
Los resultados
individuales pueden variar.



Índice

Su apoyo comienza aquí	4
Crear su equipo de apoyo	5
Aprovechar al máximo las citas con el médico	6
Rastreador de citas	8
Números de teléfono importantes	9
Listas de medicamentos	10
Cómo convertir su dosis de Acthar Gel	12
Su rutina de Acthar Gel	13
Uso del calendario de Acthar Gel	14
Su calendario de Acthar Gel	16
Información importante sobre la seguridad	18

Su apoyo comienza aquí

Con el apoyo al paciente de Acthar, tiene un Enfermero Guía dedicado* que:

- Responde a preguntas sobre su afección y sobre Acthar Gel, y lo guía a los recursos de apoyo.
- Coordina la capacitación gratuita, individual, sobre inyecciones en su hogar, en línea o por teléfono, cuando comience a usar Acthar Gel y si necesita capacitación adicional en una fecha posterior.



*El Enfermero Guía no proporciona asesoramiento médico y le indicará que hable con su médico para obtener respuestas a las consultas médicas.

Al trabajar en paralelo con su Enfermero Guía, el administrador de su caso le ofrece ayuda continua y lo ayudará con:

- Cobertura del seguro
- Opciones de asistencia

Para obtener más información, visite Acthar.com

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA (continuación)

NO USE Acthar hasta haber hablado con su médico si se da alguna de las siguientes circunstancias:

- Lo han operado recientemente.
- Tiene úlceras de estómago o antecedentes de úlceras de estómago.
- Padece insuficiencia cardíaca.
- Tiene presión sanguínea alta no controlada.
- Padece la enfermedad de Addison o el síndrome de Cushing.
- Es alérgico a las proteínas derivadas del cerdo.
- Existe sospecha de infecciones congénitas (en los niños menores de 2 años).

Advierta a su médico sobre cualquier otro problema de salud que tenga. Entregue a su médico una lista completa de los medicamentos que está tomando, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales.

4 **Consulte la Información Importante sobre la seguridad en las páginas 18-20, y la [Información de prescripción](#) completa.**

Crear su equipo de apoyo

Tener personas que le ayuden a controlar una afección médica es una parte importante de su atención. Puede ser útil identificar quién compone su equipo de apoyo, qué tipo de apoyo puede proporcionar cada persona, cuándo están disponibles y la mejor forma de contactar con ellos.

Fuentes de apoyo

Enumere el apoyo que le gustaría recibir durante el tratamiento y escriba a quién puede pedir ayuda.

TIPO DE APOYO	NOMBRE	DISPONIBILIDAD	TELÉFONO/CORREO ELECTRÓNICO
Va conmigo a mis citas			
Me ayuda a inyectarme			
Me ayuda a mantenerme en el buen camino			
En caso de emergencia			

Asegúrese de añadir los mejores números de teléfono para su Enfermero Guía y administrador del caso a “Números de teléfono importantes” en la página 9.



¿Necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo
Llame al Programa de apoyo para el paciente de Acthar al **1-888-435-2284**

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 9 p.m., hora del este
Los sábados, de 9 a.m. a 2 p.m., hora del este

Acthar[®]GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

Patient Support

Aprovechar al máximo las citas con el médico

Prepararse con antelación puede garantizar que el tiempo que pasa con su médico sea productivo y útil. Estos son algunos consejos que le ayudarán a prepararse para las citas:



LEA

sobre su afección y sus opciones de tratamiento.



ANOTE

tanto sus medicamentos de venta con receta como los de venta libre (incluidas vitaminas y suplementos herbarios), junto con su dosis para cada uno de los efectos secundarios que pueda haber experimentado. Asegúrese de compartirlo con su médico.



ESCRIBA

cualquier pregunta o inquietud de la que desee hablar con su médico.



PIDA a

un miembro de la familia o amigo que vaya con usted para obtener apoyo, para que le ayude a asegurarse de que se aborden las preguntas importantes y que le ayude a recordar o escribir lo que su médico le diga.

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar?

- Nunca inyecte Acthar directamente en vena.
- Inyecte siempre Acthar debajo de la piel o en el músculo.
- Siga las instrucciones de su médico para las inyecciones de Acthar.
- Nunca deje el tratamiento de repente, a menos que se lo indique su médico.
- Intente no saltarse ninguna de las citas programadas con el médico; es importante que le hagan revisiones médicas mientras esté en tratamiento con Acthar.

Consulte la Información Importante sobre la seguridad en las páginas 18-20, y la [Información de prescripción](#) completa.

Preguntas para hacerle a su médico

Puede ser útil tener preguntas preparadas antes de las visitas a su médico, especialmente si se siente apurado durante las citas. A continuación se muestra una lista de preguntas que puede encontrar útiles para llevar a su próxima visita al médico.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
¿Cuáles son los objetivos de mi tratamiento con Acthar Gel?	
¿Cuál es mi dosis de Acthar Gel?	
¿Cómo y cuándo debo tomar mi dosis de Acthar Gel?	
¿Cómo sabré si Acthar Gel está funcionando?	
¿Durante cuánto tiempo tendré que tomar Acthar Gel?	
¿Qué efectos secundarios podría experimentar? ¿Qué debo hacer si los experimento?	
¿Hay algún recurso de apoyo para ayudarme a manejar mi afección?	

Rastreador de citas

Es importante que anote cómo se encuentra, lo que le dice su médico y cualquier objetivo del tratamiento que analice con su médico. Puede utilizar el espacio siguiente para ayudarlo a mantener un registro.

FECHA/HORA DE LA CITA	LOS PUNTOS QUE SE DEBEN COMENTAR
	Objetivos del tratamiento:

Números de teléfono importantes

Añada y actualice números de teléfono importantes para los miembros de su equipo de apoyo. Añada enfermeros, asistentes médicos y otros según sea necesario.

CONTACTO	NOMBRE	TELÉFONO
Especialista		
Médico de atención primaria		
Enfermero		
Enfermero Guía		
Administrador de Casos		
Su farmacia especializada		

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- Puede hacer que sea más propenso a contraer infecciones nuevas, y también a que se activen las infecciones antiguas. Informe a su médico si observa algún signo de infección. Acuda al médico ante el primer signo de infección o la aparición de fiebre. Son signos de infección, aparte de la fiebre, la tos, los vómitos o la diarrea. Otros signos pueden ser los de la influenza o gripe, o cualquier cortadura abierta o llaga.
- Con el tratamiento prolongado de Acthar las glándulas suprarrenales pueden producir cantidades excesivas de una hormona llamada cortisol capaz de provocar síntomas del síndrome de Cushing como aumento de la grasa en el tronco, cara redondeada («cara de luna llena»), facilidad para los moretones o debilidad muscular.
- A veces, al dejar de recibir un tratamiento prolongado con Acthar, el organismo no fabrica suficiente cortisol natural; a esto se le llama «insuficiencia suprarrenal». Es posible que su médico le recete un corticoesteroide como protección hasta que las glándulas suprarrenales se recuperen.

Acthar[®] GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

Patient Support

Cómo convertir su dosis de Acthar Gel

Es posible que tenga que convertir la dosis recetada de Acthar Gel de unidades a mililitros (ml). Esto se debe a que la cantidad de medicamento que extraerá en la jeringa para inyección se mide en ml.

La tabla de la derecha puede ayudar con la conversión. Debe hablar con su médico si tiene alguna pregunta sobre la conversión de su dosis recetada de Acthar Gel.

Los valores mostrados se proporcionan únicamente como ejemplos. Esta no es una lista de todas las posibles dosis recetadas.

UNIDADES RECETADAS	CANTIDAD DE INYECCIÓN
80 unidades	1 ml
60 unidades	0.75 ml
40 unidades	0.5 ml
20 unidades	0.25 ml

Acuérdese de tomar Acthar Gel exactamente como le haya recetado su médico. Le ha recetado la dosis correcta para usted según sus antecedentes médicos y su afección.

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD IMPORTANTE ESPECÍFICA

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar? (continuación)

- El uso de Acthar puede hacer que esté irritable o deprimido, y también podría tener cambios de humor o trastornos del sueño. Estos efectos revierten al suspender la administración de Acthar.
- Si tiene otras dolencias, como por ejemplo diabetes o debilidad muscular, puede notar que empeoran.
- Puede presentar ciertas enfermedades oculares, como cataratas, glaucoma o lesión del nervio óptico.
- Su organismo puede desarrollar alergias a Acthar, que pueden ser graves. Los signos de una reacción alérgica pueden incluir:
 - Sarpullido en la piel y comezón
 - Hinchazón de la cara, la lengua, los labios o la garganta
 - Problemas para respirar
- Los efectos de Acthar pueden intensificarse cuando se tiene hipotiroidismo o cirrosis hepática.
- El uso prolongado de Acthar puede afectar el crecimiento y el desarrollo físico de los niños, pero puede revertirse cuando Acthar ya no sea necesario.
- Acthar puede causar osteoporosis (huesos débiles).
- Acthar puede dañar al bebé no nacido; avise a su médico si está embarazada o tiene previsto quedar embarazada.

Consulte la Información Importante sobre la seguridad en las páginas 18-20, y la [Información de prescripción](#) completa.

Su rutina de Acthar Gel

Utilice la tabla siguiente para llevar un registro de las instrucciones de dosificación proporcionadas por su médico.

Tipo de inyección (marque una opción):				Con qué frecuencia:		
Vía subcutánea (debajo de la piel)		Intramuscular (en el interior de un músculo)				
N.º de unidades de Acthar Gel recetadas:		N.º de ml de Acthar Gel para inyección				
unidades		ml (Consulte la tabla de conversión en la página 12).				
Acthar Gel se toma los:						
lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
Hora del día a la que tomo Acthar Gel:						
Por la mañana		Por la tarde		Por la noche		
Mis suministros deben incluir:						
Acthar Gel vial	jeringa	aguja para inyección	aguja para extracción			
Hisopos con alcohol	Vendaje/gasa adhesiva (si es necesario)		Recipiente para objetos punzantes			
Almohadilla para inyección		Instrucciones para la inyección de Acthar Gel				
Recordatorios que utilizaré para tomar Acthar Gel:						
Recordatorios que utilizaré para el recambio de Acthar Gel:						

Tómese un tiempo ahora mismo para anotar en su calendario la fecha de inicio de su Acthar Gel, los días de sus inyecciones, su próxima cita con el médico, cuándo pedir los recambios y cualquier evento (como vacaciones, feriados, eventos especiales) que pueda tener que planificar durante su tratamiento.



No interrumpa el tratamiento con Acthar Gel sin hablar con su médico.

Acthar[®]GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

Patient Support

Uso del calendario de Acthar Gel


Utilice el calendario que empieza en la página 17 para ayudarle a llevar el control al registrar sus inyecciones de Acthar Gel. Comparta esta información con su médico en su próxima cita.

Utilícela para registrar información importante, lo que incluye:

- Cuándo y dónde se ha inyectado Acthar Gel
- Cantidad inyectada
- Próximos planes de viaje o cambios en su calendario que puedan afectar a sus inyecciones

Registre dónde se ha inyectado Acthar Gel marcando con un círculo la zona de inyección (de la A a la F) que utiliza para cada inyección. Si utiliza la zona de inyección A o E y rota el lugar de la inyección, también debe marcar con un círculo el número (1 a 4) que corresponda al lugar que utilizó. Consulte el ejemplo en la página siguiente.

Subcutánea



A Parte superior del muslo



B Abdomen



C Parte superior del brazo



D Parte posterior del brazo

Intramuscular



E Parte superior del muslo



F Parte superior del brazo

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD ESPECÍFICA

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de Acthar?

Efectos secundarios de Acthar que se reportan con frecuencia son:

- Reacción en el lugar de la inyección
- Cansancio, debilidad física y falta de energía
- Retención de líquidos
- Insomnio (dificultad para dormir)
- Dolor de cabeza
- Azúcar en la sangre alta

Consulte la Información Importante sobre la seguridad en las páginas 18-20, y la [Información de prescripción](#) completa.

Ejemplo de calendario de Acthar Gel

Contenido de muestra a continuación. No hay información real del paciente.

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.
	1	2	3	4	5	6
A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	1 ml			1 ml	Llame al Administrador de Casos	

Notas:

7	8	9	10	11	12	13
A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1 ml			1 ml			1 ml

Notas: Ajustar el calendario para que las inyecciones no caigan en sábado cuando viaje la próxima vez.

14	15	16	17	18	19	20
A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
		1 ml			1 ml	

Notas:

21	22	23	24	25	26	27
A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	1 ml			1 ml	Volver a pedir Acthar Gel	

Notas:

28	29	30	31			
A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1 ml			1 ml			

Éxitos, retos, efectos secundarios y notas para mi médico:

Pregúntele al médico sobre el uso de Acthar Gel en un día distinto del siguiente viaje.

Pregunte al médico qué podemos hacer para aliviar la inflamación articular.



¿Necesita calendarios adicionales?
Descárguelos en [Acthar.com](#)

Acthar[®]GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL


Patient Support

Su calendario de Acthar Gel

Lleve un registro de la fecha, la zona y el lugar de cada inyección de Acthar Gel.

Registre dónde se ha inyectado Acthar Gel marcando con un círculo la zona de inyección (de la A a la F) que utiliza para cada inyección. Si utiliza la zona de inyección A o E y rota el lugar de la inyección, también debe marcar con un círculo el número (1 a 4) que corresponda al lugar que utilizó.

Subcutánea



Intramuscular



¿Necesita volver a pedir Acthar Gel?

Llame al Programa de apoyo para el paciente de Acthar al **1-888-435-2284**

Consulte la Información Importante sobre la seguridad en las páginas 18-20, y la [Información de prescripción](#) completa.

Mes:

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.
ABCDEF 1 2 3 4						

Notas:

ABCDEF 1 2 3 4						
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Notas:

ABCDEF 1 2 3 4						
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Notas:

ABCDEF 1 2 3 4						
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Notas:

ABCDEF 1 2 3 4						
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Notas:

Éxitos, retos, efectos secundarios y notas para mi médico:



¿Necesita calendarios adicionales?
Descárguelos en [Acthar.com](#)

Acthar[®]GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

Patient Support

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD

NO USE Acthar hasta haber hablado con su médico si se da alguna de las siguientes circunstancias:

- Ha recibido o está a punto de recibir una vacuna de virus vivos o de virus vivos atenuados.
- Padece una enfermedad de la piel llamada esclerodermia.
- Tiene pérdida de densidad ósea u osteoporosis.
- Presenta cualquier infección, ya sea por hongos, bacteriana o viral.
- Tiene infecciones en los ojos, como el herpes simple ocular.
- Lo han operado recientemente.
- Tiene úlceras de estómago o antecedentes de úlceras de estómago.
- Padece insuficiencia cardíaca.
- Tiene presión sanguínea alta no controlada.
- Padece la enfermedad de Addison o el síndrome de Cushing.
- Es alérgico a las proteínas derivadas del cerdo.
- Existe sospecha de infecciones congénitas (en los niños menores de 2 años).

Advierta a su médico sobre cualquier otro problema de salud que tenga. Entregue a su médico una lista completa de los medicamentos que está tomando, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales.

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Acthar?

- Nunca inyecte Acthar directamente en vena.
- Inyecte siempre Acthar debajo de la piel o en el músculo.
- Siga las instrucciones de su médico para las inyecciones de Acthar.
- Nunca deje el tratamiento de repente, a menos que se lo indique su médico.
- Intente no saltarse ninguna de las citas programadas con el médico; es importante que le hagan revisiones médicas mientras esté en tratamiento con Acthar.
- Puede hacer que sea más propenso a contraer infecciones nuevas, y también a que se activen infecciones antiguas. Informe a su médico si observa algún signo de infección. Acuda al médico ante el primer signo de infección o la aparición de fiebre. Son signos de infección, aparte de la fiebre, las tos, los vómitos o la diarrea. Otros signos pueden ser los de la influenza o gripe, o cualquier cortadura abierta o llaga

- Con el tratamiento prolongado de Acthar las glándulas suprarrenales pueden producir cantidades excesivas de una hormona llamada cortisol capaz de provocar síntomas del síndrome de Cushing como aumento de la grasa en el tronco, cara redondeada («cara de luna llena»), facilidad para los moretones o debilidad muscular.
- A veces, al dejar de recibir un tratamiento prolongado con Acthar, el organismo no fabrica suficiente cortisol natural; a esto se le llama «insuficiencia suprarrenal». Es posible que su médico le recete un corticoesteroide como protección hasta que las glándulas suprarrenales se recuperen.
- Puede aparecerle presión sanguínea alta, retener demasiados líquidos y sal o tener bajos los niveles de potasio en sangre. Como consecuencia, es posible que el médico le recomiende hacer algunos cambios en su alimentación, como por ejemplo comer con menos sal o tomar ciertos suplementos.
- Las vacunas pueden no funcionar bien durante el tratamiento con Acthar. Hable con su médico sobre las vacunas que son seguras cuando se está en tratamiento con Acthar.
- Acthar puede ocultar los síntomas de otras enfermedades, con lo que su médico podría tener más dificultades para realizar un diagnóstico si hay algún otro trastorno.
- Problemas de estómago o intestinales; Acthar puede incrementar el riesgo de sangrado y de úlceras de estómago. Informe a su médico si tiene dolor de estómago, vómitos con sangre, heces con sangre o negras, cansancio excesivo, mucha sed, dificultades para respirar o aumento de la frecuencia cardíaca.
- El uso de Acthar puede hacer que esté irritable o deprimido, y también podría tener cambios de humor o trastornos del sueño. Estos efectos revierten al suspender la administración de Acthar.
- Si tiene otras dolencias, como por ejemplo diabetes o debilidad muscular, puede notar que empeoran.
- Puede presentar ciertas enfermedades oculares, como cataratas, glaucoma o lesión del nervio óptico.
- Su organismo puede desarrollar alergias a Acthar, que pueden ser graves. Los signos de una reacción alérgica pueden incluir:
 - Sarpullido en la piel y comezón
 - Hinchazón de la cara, la lengua, los labios o la garganta
 - Problemas para respirar
- Los efectos de Acthar pueden intensificarse cuando se tiene hipotiroidismo o cirrosis hepática.
- El uso prolongado de Acthar puede afectar el crecimiento y el desarrollo físico de los niños, pero puede revertirse cuando Acthar ya no sea necesario.
- Acthar puede causar osteoporosis (huesos débiles).
- Acthar puede dañar al bebé no nacido; avise a su médico si está embarazada o tiene previsto quedar embarazada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de Acthar?

Efectos secundarios de Acthar que se reportan con frecuencia son:

- Reacción en el lugar de la inyección
- Cansancio, debilidad física y falta de energía
- Retención de líquidos
- Insomnio (dificultad para dormir)
- Dolor de cabeza
- Azúcar en la sangre alta

Los efectos secundarios más frecuentes durante el tratamiento de los espasmos infantiles son:

- Mayor riesgo de infecciones
- Convulsiones
- Presión sanguínea alta
- Irritabilidad
- Fiebre


Estos efectos secundarios también se pueden observar en los adultos y en niños mayores de 2 años. En algunos niños los espasmos infantiles progresan a otras formas de convulsiones y a veces los espasmos infantiles enmascaran dichas convulsiones, que pueden manifestarse al terminar el tratamiento de los espasmos infantiles

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Acthar.

Si sufre algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca, informe a su médico. Consulte con su médico o farmacéutico para que lo asesore sobre los efectos secundarios. Para reportar a la FDA los efectos secundarios, llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch También puede reportar los efectos secundarios llamando al 1-800-844-2830.



¿Necesita calendarios adicionales?
Descárguelos en Acthar.com



¿Tiene más preguntas?

- ¿Cómo enseño a otra persona a inyectarme el Acthar Gel?
- La entrega de mi Acthar Gel no llegó cuando estaba programada. ¿Qué debo hacer?
- ¿Qué sucede si pierdo mi seguro o si cambio de seguro?

Don,
tomando Acthar Gel.
Los resultados individuales pueden variar.



Estamos aquí para ayudar.

Llame al **1-888-435-2284**

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m., hora del este
Sábados, de 9 a. m. a 2 p. m., hora del este

Acthar.com



Mallinckrodt, la marca "M" y el logotipo de Mallinckrodt Pharmaceuticals son marcas comerciales de una compañía de Mallinckrodt. El resto de las marcas son marcas comerciales de una compañía de Mallinckrodt o de sus respectivos propietarios
© 2022 Mallinckrodt. US-2101449 01/22

Acthar[®]GEL
(repository corticotropin injection) 80 U/mL

Patient Support